

## РОДИТЕЛЯМ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ДЕТЯМ

*Федеральное государственное учреждение  
здравоохранения «Центр гигиенического  
образования населения» Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека*

Уважаемые родители!

**Вам необходимо знать, что только профилактические прививки** могут защитить Вашего ребенка от таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, гепатит В, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха.

**Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в Национальный календарь профилактических прививок России?**

**Полиомиелит** (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание преимущественно, поражающее центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Заболевание приводит к развитию параличей, приводящих заболевшего ребенка к инвалидизации.

**Острый гепатит В** - тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением печени. Перенесенный в раннем возрасте вирусный гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени и первичному раку печени. Чем младше возраст, в котором происходит инфицирование, тем выше вероятность стать хроническим носителем вируса.

**Туберкулез** - заболевание поражает лёгкие и бронхи, однако возможно поражение и других органов. При туберкулезе возможно развитие генерализованных форм, в том числе и туберкулезного менингита, устойчивых к противотуберкулезным препаратам.

**Коклюш** - инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является поражение легких (бронхопневмония), особенно в грудном возрасте. Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие возникновения судорог, может привести к смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.

**Дифтерия** - острое инфекционное заболевание, характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем, а также местным воспалительным процессом с образованием фибринового налета. Возможны такие осложнения дифтерии как инфекционно-токсический шок, миокардиты, моно- и полиневриты, включая поражения черепных и периферических нервов, поражения надпочечников, токсический нефроз.

**Столбняк** - поражает нервную систему и сопровождается высокой летальностью вследствие паралича дыхания и сердечной мышцы.

**Корь** - заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, не поддающейся антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей.

**Эпидемический паротит (свинка)** - заболевание может осложняться серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением поджелудочной железы. Свинка является одной из причин развития мужского и женского бесплодия, так как вирус может поражать яички и яичники.

**Краснуха** - представляет большую опасность для беременных, которые могут заразиться от больных детей. Заболевание краснухой беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и мертворождениям.

### **РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!**

**Прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных заболеваний!**

**Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего ребенка!**

**Помогите Вашему ребенку!**

**Защитите его от инфекционных заболеваний, и от вызываемых ими тяжелых осложнений и последствий!**

**Дайте ему возможность бесплатно получить необходимую прививку в строго определенном возрасте.**

#### **Сроки проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок**

<b>Возраст ребенка</b>	<b>Вид прививки</b>
<b>Новорожденные</b> (в первые 12 часов жизни)	Первая прививка (вакцинация) против вирусного гепатита В.
<b>3-7 день жизни</b>	Прививка (вакцинация) против туберкулеза.
<b>1 месяц</b>	Вторая прививка (вакцинация) против вирусного гепатита В.
<b>3 месяца</b>	Первая прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
<b>4,5 месяца</b>	Вторая прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
<b>6 месяцев</b>	Третья прививка (вакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита. Третья прививка (вакцинация) против вирусного гепатита В.
<b>12 месяцев</b>	Первая прививка (вакцинация) против кори, эпидемического паротита, краснухи
<b>18 месяцев</b>	Повторная прививка (первая ревакцинация) против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита.
<b>20 месяцев</b>	Повторная прививка (вторая ревакцинация) против полиомиелита.
<b>6 лет</b>	Повторная прививка (ревакцинация) против кори, краснухи, эпидемического паротита.
<b>6-7 лет</b>	Повторная прививка (вторая ревакцинация) против дифтерии, столбняка.
<b>7 лет</b>	Повторная прививка (ревакцинация) против туберкулеза.
<b>14 лет</b>	Повторная прививка (третья ревакцинация) против дифтерии, столбняка, полиомиелита. Повторная прививка (ревакцинация) против туберкулеза.

**Часто родители задают вопросы по поводу проведения профилактических прививок. Вот некоторые из них:**

- *Всем ли детям можно делать прививки?*  
Существуют медицинские противопоказания к проведению профилактических прививок. Их определяет только врач.
- *Почему прививки делают повторно?*  
Для выработки и поддержания надежного иммунитета.
- *Можно ли прививать часто болеющих, ослабленных детей?*  
Ослабленных детей необходимо прививать в первую очередь, так как они наиболее подвержены инфекциям, протекающим у них, как правило, в тяжелой форме. Сроки проведения прививок таким детям определяет врач.
- *Не вызывают ли вакцины аллергию у детей?*  
Научные исследования и клинические наблюдения показывают, что даже у детей с аллергией вакцины не вызывают аллергических реакций.
- *Может ли быть у ребенка реакция на прививку?*  
У детей после прививки могут развиваться реакции в месте введения вакцины (краснота, отечность, болезненность) и общие реакции (повышение температуры и нарушение самочувствия, сна, аппетита, плаксивость и т.п.). Местные реакции, а также общие реакции после введения инактивированных вакцин развиваются в первые 24 часа. Их продолжительность, как правило, не превышает 3-х дней. Общие реакции после прививок вакцинами против кори, эпидемического паротита, краснухи появляются в период от 5 до 14 суток после прививки.
- *Может ли заболеть привитый ребенок?*  
Да, может, так как ни одна вакцина не дает 100% гарантии защиты от инфекции. Но это происходит редко. Привитый ребенок переносит заболевание в легкой форме и без осложнений.
- *Как нужно подготовить ребенка к прививкам?*  
Перед прививкой и после прививки постарайтесь не включать в питание ребенка новых пищевых продуктов, а также продуктов, на которые Ваш ребенок реагирует аллергическими проявлениями. В это же время ребенка следует предохранять как от переохлаждения, так и от перегревания, а также от контактов с инфекционными больными.
- *В чем нуждается ребенок после проведения прививки?*  
Во внимательном отношении со стороны родителей. В случае изменения поведения ребенка, повышения температуры до 38 С и выше, появления жалоб, родители должны обязательно обратиться к врачу.